

Register for Selvmordsforsøg

Resultater for 2012 og 2013

Af Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske Anne-Katrine Thru Mikkelsen og cand.scient.san. Christina Petrea Larsen

Center for Selvmordsforskning har afsluttet beregningerne for registrerede selvmordsforsøg på følgende somatiske sygehuse i Region Syddanmark: Fredericia, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg sygehus. Beregningerne er foretaget på baggrund af data for årene 2012 og 2013. Data er indhentet på baggrund af dataudtræk fra Landspatientregistret på kontaktårsagskoden 4 (selvmordsforsøg) med skadehandling EUW (somatisk), samt på ICD-10 koderne X60-X84. To medarbejdere fra Center for Selvmordsforskning har via dataudtrækket samt journaladgang indhentet oplysninger omkring det enkelte selvmordsforsøg. På denne måde er der samtidig foretaget validering af data.

Omstændighederne ved selvmordsforsøget er registreret ud fra de udsagn som personen, der har forsøgt at begå selvmord, er fremkommet med under journaloptagelsen på sygehuset og dermed også ud fra den lægefaglige vurdering af personen ved


samme kontakt. Ud fra journalmaterialet har to af Center for Selvmordsforskningens medarbejdere registreret de omstændigheder ved den enkeltes selvmordsforsøg, der fremgår af journalmaterialet. Registreringen er således baseret på de oplysninger, der fremgår af personens journal og dermed ikke direkte fra personen selv. Derfor skal eventuelle konklusioner på baggrund af de registrerede omstændigheder foretages med forsigtighed og forbehold.

Resultaterne af registreringerne vedrører følgende områder: 'Antal selvmordsforsøg', 'Metode', 'Omstændigheder' og 'Alkohol'.

Selvmordsforsøg

Det samlede antal selvmordsforsøg, der er registreret på ovennævnte sygehuse i Region Syddanmark for årene 2012-2013, fordeler sig således:

Antal selvmordsforsøg 2012 og 2013 fordelt på køn



Metode

Metoden indgår i registreringen af selvmordsforsøg. Den hyppigst registrerede metode fordelt på køn, registreret i årene 2012-2013 for nævnte sygehuse, er metoden "Forgiftning". Dette er gældende for både kvinder og mænd. Metoden dækker over medicinforgiftning samt forgiftning med andre stoffer som fx opløsningsmidler, euforiserende stoffer og CO₂. Resultaterne viser, at det overvejende hyppigst anvendte medicinpræparat, der er registreret hos både mændene og kvinderne, er Paracetamol. Dette med undtagelse af de mænd som er registreret på Aabenraa Sygehus i 2012 hos hvilke, de hyppigst anvendte præparater klassificeres som "Antidepressive præparater".

Omstændigheder

Via journaladgang har det været muligt at finde oplysninger omkring den enkelte persons situation forud for selvmordsforsøget og derved opnå kendskab til de udløsende (proximale) omstændigheder samt de bagvedliggende (distale) omstændigheder herfor.

Kvinder

Den hyppigst udløsende (proximale) omstændighed registreret for kvinderne, ved ovenstående sygehuse for 2012 og 2013, er: "Ukendt". Herefter optræder "Livet er hårdt", "Skænderi/uoverensstemmelse/konflikt med nær person" og "Psykisk sygdom".

Mænd

Den hyppigst registrerede udløsende (proximale) omstændighed for mændene er: "Ukendt". De næst hyppigste udløsende registrerede omstændigheder er: "Livet er hårdt" og "Brud i forhold".

Registreringerne af de bagvedliggende (distale) omstændigheder fordeler sig således:

Hos kvinderne er den hyppigst registrerede bagvedliggende omstændighed ved et selvmordsforsøg: "Psykisk sygdom", den næst hyppigst er "Ukendt". De samme resultater gør sig gældende for mændenes vedkommende.

Som det fremgår, er der ved flere selvmordsforsøg registreret, at omstæn-

digheden er "Ukendt", hvilket gør sig gældende både ved proximale samt distale omstændigheder hos begge køn. Kategorien "Ukendt" betyder, at det ud fra journalmaterialet ikke har været muligt at registrere nogle omstændigheder ved selvmordsforsøget. Dette kan evt. skyldes travlhed på den enkelte skadestue, hvor der i patientkontakten ikke har været tid til nærmere samtale om bevæggrundene for selvmordsforsøget eller manglende meddelssomhed fra patienten.

Alkohol

Af resultaterne fremgår det endvidere i hvor mange af selvmordsforsøgene, der er registreret, at personen har indtaget alkohol. Det viser sig, at der hos kvinderne er indtaget alkohol i forbindelse med selvmordsforsøg i i alt 91 ud af de samlede 464 registrerede selvmordsforsøg (19,6 %). For mændene viser resultatet, at der er indtaget alkohol i i alt 84 ud af de samlede 256 (32,8 %) registrerede selvmordsforsøg.

Nærmere oplysninger

Yderligere oplysninger om projektet *Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg* kan fås ved henvendelse til:

Sundhedsfaglig akademisk medarbejder
Christina Petrea Larsen
Tlf. 63 11 21 88
E-mail: crpe@cfsmail.dk.

Psykiatrisk sygeplejerske
Anne Katrine Thruue Mikkelsen
Tlf. 63 11 21 91
E-mail: akm@cfsmail.dk.

Yderligere oplysninger kan også findes på centrets hjemmeside:
www.selvmordsforskning.dk

Finansiering

Projektet er finansieret af H. Lundbeck A/S samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Center for Selvmordsforskning varetager forskning i og vidensformidling om selvmordsadfærd, registrering af selvmord og selvmordsforsøg.

Centret er selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold